

ジヒドロコデインリン酸塩配合製品の使用上の注意改訂について

このたび、厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課より発出されました平成 29 年 7 月 4 日付け薬生安発 0704 第 1 号通知に基づき、ジヒドロコデインリン酸塩を配合する製品について、使用上の注意を改訂することになりました。なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

◇改訂箇所及び改訂内容

改訂箇所	改訂内容（下線部追加）
相談すること	次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 次の診断を受けた人。 <u>呼吸機能障害、閉塞睡眠時無呼吸症候群、肥満症</u> 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 <u>呼吸抑制：息切れ、息苦しさ等があらわれる。</u>
用法及び用量に関連する注意	<u>12 歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること。</u> *12 歳未満の小児の用法及び用量を有する製品に記載する。

◇対象製品

かぜ薬

- ・布亀かぜゴールドカプセル A
- ・総合かぜ薬ヨカボンカプセル A
- ・総合かぜ薬ラドンカプセル A
- ・ビノック顆粒 S
- ・新ビノックエース

鎮咳去痰薬

- ・鎮咳祛痰剤ポリコデン錠
- ・強力せきどめコデン K
- ・コバドリン A 錠

*逐一添付文書等の改訂を行っています。最新の添付文書についてはホームページ製品一覧で閲覧くださいますようお願い申し上げます。