

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

# 解熱鎮痛薬 ノーカイA

第2類医薬品



## 使用上の注意

### × してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人は。
- (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳幼・小児(15才未満)。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

#### 4. 服用時は飲酒しないでください

#### 5. 長期連用しないでください



まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

#### ぜんそく

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

## ■効能・効果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛  
(2) 悪寒・発熱時の解熱

## ■用法・用量

次の量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。

服用間隔は、4時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日3回を限度
7才以上15才未満	1/2包	
7才未満の幼児		服用しないこと

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を厳守してください。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■有効成分・分量

成 分	3包中
アセトアミノフェン	800mg
エテンザミド	900mg
アリルイソプロピルアセチル尿素	180mg
無水カフェイン	250mg

添加物として乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)  
(4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。  
(5) 配置期限(外装に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

## ■お問い合わせ先

本剤について何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間: 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元 布 亀 株 式 会 社

〒663-8585 兵庫県西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 新新薬品工業株式会社

〒930-2221 富山県富山市今市324番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

55581 N · 8 H