

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃の痛み・胃部不快感・胃もたれ・二日酔い

新新A胃腸薬細粒

第2類医薬品

特徴

新新A胃腸薬細粒は、制酸成分、消化酵素、健胃生薬や鎮痙成分、さらに胃粘膜修復成分(アルジオキサ、カンゾウ末)を配合した胃腸薬です。食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、はきけ、胃痛、消化不良、胃部・腹部膨満感等に効果があります。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

■効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化促進、消化不良、胃弱

■用法・用量

次の量を食後又は食間(就寝前を含む)に服用してください。
ただし、食欲不振(食欲減退)の場合は、食前に服用してください。

年齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量 3包(4.5g)中、次の成分を含みます。

成 分	含 量	はたらき
合成ヒドロタルサイト	1000mg	過剰の胃酸を中和して、不快な過酸症状を改善します。
沈降炭酸カルシウム	1000mg	
ピオチアスターゼ2000	100mg	炭水化物、蛋白質の消化を助けます。
リパーゼAP12	30mg	脂肪の消化を助けます。
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌を抑え、胃の痛みを和らげます。
アルジオキサ	150mg	胃粘膜を保護します。
カンゾウ末	150mg	
ソウジュツ末	100mg	低下した胃腸のはたらきを活発にし、消化液の分泌を促して消化機能を整えます。
ケイヒ末	300mg	
ウイキョウ末	105mg	
チョウジ末	60mg	

添加物：L-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、セルロース、無水ケイ酸、ポビドン含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いします。

新新薬品工業株式会社 お客様相談室
電 話 076-435-0878
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **新新薬品工業株式会社**
富山県富山市今市324番地